

(17)脳卒中患者の平均在院日数

分子：分母対症例の在院延べ日数

分母：主病名が「脳卒中」の退院患者数

(ア) くも膜下出血 (160 \$) (JCS30 未満,JCS30 以上)

(イ) 脳内出血 (161 \$) (JCS30 未満,JCS30 以上)

(ウ) 脳梗塞 (163 \$) (JCS30 未満,JCS30 以上)

※死亡退院患者、転院は除外

※それぞれ重症度別に算出 (6つ)

収集期間： DPC 以外病院：平成 28 年 4 月～平成 29 年 3 月

脳卒中とは、脳血管障害（脳血管疾患）のうち、急激に発症したものをいいます。

脳血管障害の中に、くも膜下出血・脳内出血（脳の血管が破れることによる出血）・脳梗塞（脳の血管が詰まる）があります。脳卒中では様々な症状が出現しますが、その中に意識障害があります。


JCS とは、日本で主に使用される意識障害の深度（意識レベル）の分類のことです（Japan Coma Scale）。開眼状態によって大きく 3 段階に分類し、さらに 3 段階に細分、計 9 段階で意識レベルを評価します。点数が大きいほど重症です。以下に具体的な状態を示します。

※下の表は、**JCS30** を太字で示しています。

I. 刺激しないでも覚醒している状態	
1点	だいたい意識清明だが、いまひとつはっきりしない
2点	見当識障害（自分がなぜここにいるのか、ここはどこなのか、といった状態が理解されていない状態）がある
3点	自分の名前、生年月日が言えない
II. 刺激すると覚醒するが刺激をやめると眠り込む状態	
10点	普通の呼びかけで容易に開眼する
20点	大きな声または体をゆさぶることにより開眼する
30点	痛み刺激を加えつつ呼びかけを繰り返すと、かろうじて開眼する
III. 刺激をしても覚醒しない状態	
100点	痛み刺激に対し、払いのけるような動作をする
200点	痛み刺激で少し手足を動かしたり、顔をしかめる
300点	痛み刺激に反応しない


指標 17：脳卒中患者の平均在院日数－くも膜下出血（160\$）

医療機関種別	医療機関コード	医療機関名	母数	延べ在院日数	平均在院日数
DPC以外病院	230400417	愛知県済生会リハビリテーション病院	27	1,520	56.3
DPC以外病院	242705150	明和病院	12	1,077	89.8
DPC以外病院		10例未満(6施設)	13	1,097	84.4
		DPC以外病院 全体	52	3,694	71.0



指標 17：脳卒中患者の平均在院日数—脳内出血（161\$）

医療機関種別	医療機関コード	医療機関名	母数	延べ在院日数	平均在院日数
DPC以外病院	033010225	岩泉病院	114	4,593	40.3
DPC以外病院	111700368	鴻巣病院	16	840	52.5
DPC以外病院	230400417	愛知県済生会リハビリテーション病院	423	19,896	47.0
DPC以外病院	242705150	明和病院	277	20,632	74.5
DPC以外病院	350311776	湯田温泉病院	129	14,112	109.4
DPC以外病院	380210603	今治第二病院	78	3,092	39.6
DPC以外病院	404419164	大牟田病院	154	7,221	46.9
DPC以外病院	460110910	鹿児島病院	45	1,588	35.3
		DPC以外病院 全体	1,236	71,974	58.2



指標 17：脳卒中患者の平均在院日数—脳梗塞（163 \$）

医療機関種別	医療機関コード	医療機関名	母数	延べ在院日数	平均在院日数
DPC以外病院	033010225	岩泉病院	23	678	29.5
DPC以外病院	230400417	愛知県済生会リハビリテーション病院	191	8,458	44.3
DPC以外病院	242705150	明和病院	110	8,941	81.3
DPC以外病院	350311776	湯田温泉病院	30	5,345	178.2
DPC以外病院	380210603	今治第二病院	19	845	44.5
DPC以外病院	404419164	大牟田病院	35	2,008	57.4
DPC以外病院		10例未満(2施設)	7	742	106.0
		DPC以外病院 全体	415	27,017	65.1

